

Prise d'oléorésine

MODE D'EMPLOI

- Vider la pipette et bien **agiter le flacon**.
- Compter le nombre de gouttes prescrit dans une cuillère (ou autre récipient adapté) puis déposer le contenu sous la langue.
- **Laisser agir** environ 1 minute.
- Si le goût est trop désagréable, prendre une boisson lactée, un jus de fruit ou autre boisson de votre choix, après la prise d'oléorésine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'embout de la pipette doit être plat.
- Stocker le récipient au frigo après ouverture.
- **CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**



Dosage des oléorésines

Protocole prudent	Jour 1-3	Jour 4-6	Jour 7-9	Jour 10-12	Jour 13-15	Jour 16-18	Jour 19-21	Jour 22-24	Jour 25-27	Jour 28-30
mg CBD/ jour	5	10	20	30	40	x	x	x	x	x
mg THC / jour						1	2	3	4	5
nb Δ^* Oléorés. CBD 5% /j	5	10	20	30	40	x	x	x	x	x
nb Δ^* Oléorés. THC 2.5% /j						2	4	6	8	10

Protocole standard	Jour 1-3	Jour 4-6	Jour 7-9	Jour 10-12	Jour 13-15	Jour 16-18	Jour 19-21	Jour 22-24	Jour 25-27	Jour 28-30
mg CBD/ jour	10	20	30	40	x	x	x	x	x	x
mg THC / jour					2.5	5	7.5	10	12.5	15
nb Δ^* Oléorés. CBD 5% /j	5	10	20	30	40	x	x	x	x	x
nb Δ^* Oléorés. THC 2.5% /j					5	10	15	20	25	30

Protocole ciblé	Jour 1-3	Jour 4-6	Jour 7-9	Jour 10-12	Jour 13-15	Jour 16-18	Jour 19-21	Jour 22-24	Jour 25-27	Jour 28-30
mg CBD/ jour	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
mg THC / jour	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
nb Δ^* Oléorés. CBD 5% /j	3	5	8	10	13	15	18	20	23	25
nb Δ^* Oléorés. THC 2.5% /j	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

* Δ avec compte goutte à bec plat = 0.02g ou 0.021ml